

**Información para el paciente**  
**UBRELVY® (iu-brel-vi)**  
(ubrogepant)  
comprimidos para uso por vía oral

**¿Qué es UBRELVY?**

UBRELVY es un medicamento con receta médica que se utiliza para el tratamiento agudo de los ataques de migraña con o sin aura en adultos.

UBRELVY no se utiliza para prevenir las migrañas.

Se desconoce si UBRELVY es seguro y eficaz en niños.

**¿Quién no debe usar UBRELVY?**

**No tome UBRELVY si:**

- Toma medicamentos conocidos como inhibidores potentes de la CYP3A4, como ketoconazol, claritromicina o itraconazol. Consulte a su proveedor de atención médica si no está seguro de si está tomando uno de estos medicamentos. Su proveedor de atención médica puede informarle si es seguro tomar UBRELVY con otros medicamentos.
- Es alérgico al ubrogepant o a cualquiera de los componentes de UBRELVY. Consulte al final de esta Guía del medicamento la lista completa de ingredientes de UBRELVY.

**Antes de tomar UBRELVY, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, entre ellas si:**

- Tiene problemas hepáticos.
- Tiene problemas renales.
- Está embarazada o tiene intención de quedar embarazada. Se desconoce si UBRELVY dañará a su bebé en gestación.
  - Registro de embarazos: Hay un registro de embarazos para mujeres que toman UBRELVY. El objetivo del registro es recabar información acerca de su salud y la salud de su bebé. Hable con su proveedor de atención médica o llame al 1-833-277-0206 para inscribirse en este registro. También puede visitar <http://emprespregnancyregistry.com>.
- Está amamantando o tiene intención de hacerlo. Se desconoce si UBRELVY pasa a la leche materna.

**Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma**, incluidos los de venta con receta médica y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

En particular, informe a su proveedor de atención médica si toma alguno de los siguientes, ya que es posible que este deba cambiar la dosis de UBRELVY:

- verapamilo
- ciclosporina
- ciprofloxacina
- fluconazol
- fluvoxamina
- fenitoína
- barbitúricos
- rifampina
- hierba de San Juan
- quinidina
- carvedilol
- eltrombopag
- curcumina

Estos no son todos los medicamentos que podrían afectar al funcionamiento de UBRELVY. Su proveedor de atención médica puede informarle si es seguro tomar UBRELVY con otros medicamentos.

Haga una lista de sus medicamentos para mostrársela a su proveedor de atención médica o a su farmacéutico cuando le den un nuevo medicamento.

**¿Cómo debo tomar UBRELVY?**

- Tome UBRELVY exactamente como le indique su proveedor de atención médica.
- Tome UBRELVY con o sin alimentos.
- La mayoría de los pacientes pueden tomar un segundo comprimido 2 horas después del primer comprimido, según sea necesario.
- No debe tomar un segundo comprimido en un plazo de 24 horas si consume pomelo o zumo de pomelo o está tomando medicamentos que pueden incluir:
  - verapamilo
  - ciclosporina
  - ciprofloxacina
  - fluconazol
  - fluvoxamina
- Se desconoce si es seguro tomar UBRELVY durante más de 8 migrañas en 30 días.
- Debe anotar cuándo tiene dolores de cabeza y cuándo toma UBRELVY para poder hablar con su proveedor de atención médica sobre cómo funciona UBRELVY en su caso.
- Si toma demasiados comprimidos de UBRELVY, llame a su proveedor de atención médica o acuda de inmediato a la sala de emergencias del hospital más cercano.

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de UBRELVY?

**UBRELVY puede causar efectos secundarios graves, que incluyen los siguientes:**

- Reacciones alérgicas. Pueden producirse reacciones alérgicas después de tomar UBRELVY. La mayoría de las reacciones se produjeron en cuestión de horas y no fueron graves. Algunas reacciones pueden producirse días después de tomar UBRELVY. Llame a su proveedor de atención médica o busque ayuda de urgencia de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas, que pueden formar parte de una reacción alérgica:
  - Hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta
  - Dificultad para respirar

Los efectos secundarios más frecuentes de UBRELVY son náuseas y adormecimiento.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de UBRELVY. Llame a su proveedor de atención médica para recibir asesoría médica acerca de los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

### ¿Cómo debo conservar UBRELVY?

- Conserve UBRELVY a temperatura ambiente, entre 68 °F y 77 °F (20 °C y 25 °C).

**Mantenga UBRELVY y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.**

### Información general sobre el uso seguro y eficaz de UBRELVY.

A veces los medicamentos se recetan con fines distintos a los detallados en el folleto informativo para el paciente. No use UBRELVY para una afección para la cual no se recetó. No dé UBRELVY a otras personas, aunque estas tengan los mismos síntomas que usted. Podría causarles daño. Puede solicitar a su farmacéutico o proveedor de atención médica información sobre UBRELVY que está escrita para los profesionales de la salud.

### ¿Cuáles son los ingredientes de UBRELVY?

**Ingrediente activo:** ubrogepant

**Ingredientes inactivos:** dióxido de silicio coloidal, croscarmelosa de sodio, manitol, celulosa microcristalina, copolímero de acetato de vinilo de polivinilpirrolidona, cloruro de sodio, estearilfumarato de sodio y polietilenglicol succinato de vitamina E.

Fabricado para:  
AbbVie Inc.  
North Chicago, IL 60064  
© 2023 AbbVie. Todos los derechos reservados.  
UBRELVY y su diseño son marcas comerciales de Allergan Pharmaceuticals International Limited, una compañía de AbbVie.

Este prospecto del envase para el paciente ha sido aprobado Emitido: 6/2023 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 20079163

LAB-9719 **VERSIÓN MAESTRA EN INGLÉS**  
LAB-9723 **VERSIÓN MAESTRA EN ESPAÑOL**

**LAB-10712**